

COMUNICAT
In atentia calatorilor care merg in zonele din Brazilia
care au risc de transmitere a febrei galbene

Organizatia Mondiala a Sanatatii informeaza cu privire la cresterea semnificativa a activitatii febrei galbene, cu cazuri confirmate la primata si populatia umana, asociate cu transmiterea silvatica a virusului intre primata si speciile de tantari, in mai multe state din Brazilia. Aceste cazuri sunt inregistrate in zone dinspre coasta Atlanticului, care nu au fost considerate anterior ca fiind ca fiind expuse riscului de transmitere a febrei galbene. Noile zone pentru care se recomanda vaccinarea impotriva febrei galbene pentru calatoariile internationale sunt:

- **Statul Bahia** extinderea zonelor de risc de transmitere a febrei galbene cu includerea urmatoarelor municipalitati in partea de sud si de sud-vest a statelor : Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Ilheus, Itacare, Mucuri, NOVA Visosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz, Cabralia, Una, Urusuca, Almadina, O varsta, Arataca, Barra de Chosa, Barro Preto, Belo Campo, Buerarema, Caatiba, Carmacan, Vanzari Candido, Coaraci, Condeaba, Cordeiros, Encruzilhada, Eunapolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapuua, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itaju do Colonia, Itajuipe, Itamaraju, Itambe, Itanhem, Itape, Itapebi, Itapetinga, Itarantim, Itororo, Jucurusu, Jussari, Lajedao, Macarani, Maiquinique, Maseote, Medeiros Neto, Nova Canaa, Pau Brasil, Piripa, Planalto, Posoesc, Potiragua, Ribeirao do Largo, Santa Cruz da Vitoria, Santa Luzia, Sao Jose da Vitoria , Teixeira de Freitas, Tremedal, Vereda, Vitoria da Conquista.
- **Statul Espirito Santo** risc de transmitere a febrei galbene, cu exceptia zonei urbane Vitoria.
- **Statul Rio de Janeiro** risc de transmitere a febrei galbene in municipalitatile de la granita cu Statele Minas Gerais si Espirito Santo, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje de Muriae, Miracema, Natividade, Porciuncula, Santo Antonio de Padova, Sao fidelis, Sao Jose de Uba Varre-Sai, Campos dos Goytacazes, Sao Francisco de Itabapoa, Sao Joao da Barra.

Organizatia Mondiala a Sanatatii sfatuieste calatorii care merg in zonele din Brazilia care au risc de transmitere a febrei galbene:

- sa se vaccineze impotriva febrei galbene cu cel putin 10 zile inainte de calatorie (in conformitate cu Anexa 7 din Regulamentul Sanitar International 2005, o singura doza de vaccin impotriva febrei galbene este suficienta pentru a conferi imunitate sustinuta si protectie de-a lungul intregii vietii impotriva febrei galbene);
- sa cunoasca si sa respecte masurile pentru evitarea intepaturilor de tantari;
- sa recunoasca semnele si simptomele febrei galbene;
- sa caute asistenta/consiliere medicala in cazul in care apar semne si simptome de febra galbena in timpul calatoriei sau dupa intoarcerea din zonele cu risc de transmitere a febrei galbene.