

MĂSURI PENTRU EVITAREA EXPUNERII LA ÎNȚEPĂTURI DE ȚÂNȚARI ȘI A PREVENIRII INFECTĂRII CU VIRUSUL WEST NILE

Pentru evitarea expunerii la înțepătura de țânțari, DSP Braila recomandă populației: purtarea îmbrăcăminte cu maneci lungi și pantaloni lungi, dacă se iese seara din locuințe sau seara în parc, la plimbare, sau când se merge în pădure, la pescuit, în Delta;

- utilizarea de substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor comercializate în farmacii: (DEET, icardin/picardin, IR 3535), în concordanță cu instrucțiunile de pe etichetă, substanțe pe care să le aplicăm pe părțile descoperite ale corpului;
- împiedicarea pătrunderii țânțarilor în casă (plase de protecție);
- utilizarea substanțelor insecticide în locuință/în jurul locuinței;
- utilizarea în locuință a aerului condiționat;
- utilizarea plaselor împotriva țânțarilor în jurul paturilor în cazul în care nu sunt disponibile celelalte măsuri menționate anterior sau dacă se doarme în aer liber;
- acoperirea pătuțului copilului sau căruciorului cu plase împotriva țânțarilor.

Totodată, recomandăm toaletarea zonelor cu vegetație intensă, precum și asanarea zonelor unde se pot găsi larve de țânțari:

- în apa acumulată în subsolurile blocurilor;
- în apa care nu se scurge din canalizarea înfundată;
- în bălțile care se formează în apropierea locuințelor, din apa care curge din conductele sparte și din alte instalații neîntreținute;
- în apa de ploaie păstrată în butoaie/vase în curte;
- în apa acumulată în recipiente vechi aruncate la întâmplare în preajma locuințelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării, etc.);
- în apa din gropile și șanțurile de pe șantiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalații.