

## INFORMATII ESENTIALE PENTRU VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 CU NOUL VACCIN (COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5-Pfizer BioNTech)

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila susține și recomandă vaccinarea împotriva COVID-19 ca măsură ce asigură protecție împotriva bolii, protejează împotriva apariției formelor severe până la cele critice de boală și reduce riscul de spitalizare.

Vaccinarea asigură protecție nu numai împotriva efectelor imediate ale COVID-19, cât și împotriva efectelor pe termen lung, complicații de tipul miocarditei, sindromului multiinflamator sistemic și a formei persistente de boală. Vaccinarea împotriva COVID-19 protejează persoana de apariția sechelelor determinate de sindromul post-COVID, o situație care poate afecta calitatea vieții pe o perioadă de timp .

- Vaccinarea împotriva COVID-19 este opțională. Se face la cerere, pe baza consimțământului informat și este gratuită.
- Vaccinul nu oferă protecție împotriva complicațiilor, formelor grave ale bolii și posibil pentru reducerea transmiterii.
- Acest nou vaccin este adaptat pentru tulpinile de virus aflate acum în circulație,
- Vaccinarea funcționează după principiul “primul venit, primul servit”.
- Se pot vaccina toate persoanele cu vârsta de peste 12 ani, cărora li s-a administrat schema primară de vaccinare împotriva COVID -19 cu cel puțin 3 luni înainte.
- Prin schema primară completă se înțelege:
  - 1 doză de vaccin Janssen/Johnson&Johnson
  - 2 doze de vaccin Vaxzevria/ Oxford-Astra-Zeneca

- 1 doza de vaccin Vaxzevria/Oxford-Astra-Zeneca + 1 doza de vaccin Comirnaty/Pfizer&BioNtech
  - 1 doza de vaccin Vaxzevria/Oxford-Astra-Zeneca + 1 doza de vaccin Spikevax/Moderna
  - 2 doze de Comirnaty/Pfizer&BioNtech (de tip adult sau pediatric)
  - 2 doze de vaccin Spikevax/Moderna
  - minim 3 luni de la administrarea ultimei doze din schema primara sau de la administrarea oricarei doze de rapel (booster)
- Pot exista reactii adverse la vaccinare, ca si in cazul altor vaccinuri. Cele mai frecvente sunt durere la locul injectarii, oboseala, cefalee, frison.
  - Exista contraindicatii la vaccinare numai daca persoana este alergica la substanta activa sau orice alt ingredient al vaccinului.
  - Vaccinarea se poate realiza prin programare , la toti medicii de familie care au contracte cu casele de asigurari de sanatate (medicii de familie trebuie de familie trebuie sa solicite noul vaccin de la DSP judetean).La nivelul DSP Braila este in amenajare un spatiu ce va functiona ca si centru de vaccinare la adresa Str Gradinii Publice Nr 2, Braila, Jud Braila urmand a fi anuntat momentul efectiv de functionare.
  - Vaccinul Comirnaty Original/ Omicron BA.4-5 se poate administra concomitant sau la orice interval de timp cu un alt vaccin din Programul National de Vaccinare, inclusiv cu vaccinul gripal.
  - Vaccinarea este recomandata in special la personale de peste 65 de ani , bolnavii cronici, cei care sunt la risc de a face forme severe de imbolnavire .